

LACTOWEST 88

ASSAINISSEUR POUR VIANDE ROUGE ET VOLAILLE

LACTOWEST 88 est un produit à base d'acide lactique formulé spécialement pour les traitements des carcasses de viandes rouges et de volailles. Il possède un large spectre antimicrobien.

LACTOWEST 88 est un agent de conservation naturel, un anti oxygène et un acidifiant.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Non moussant
- Produit à base d'acide lactique
- Peut être utilisé par vaporisation, en immersion et par circulation



MODE D'EMPLOI

Techniques	Vaporisation, immersion et circulation.
Concentration	1,8 à 4,0% (18 ml à 40 ml par litre.)
Température	5°C à 40°C (41 à 104°F).
Temps d'opération/ temps de contact	Préférentiellement 1 heure.
Rinçage	Rinçage à l'eau potable. (Le rinçage à l'eau potable n'est pas requis si le résidu est négligeable.)

LACTOWEST 88 ASSAINISSEUR POUR VIANDE ROUGE ET VOLAILLE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence

Liquide clair, incolore

Odeur

Caratéristique

Poids spécifique @ 20 °C

1.20

Viscosité

< 60 mPa.s @ 25°C

pH

< 2

Point d'éclair (TCC)

Aucun

Solubilité dans l'eau

Complète

Température d'auto inflammation

Aucune

Chlore

Non

Point d'ébullition

122°C

Point de congélation

Pas disponible

Tendance au moussage

Non moussant

Techniques de mesure de concentration

Conductivité électrique, titrage

Rinçage

Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Produits chlorés et oxydants

ENTREPOSAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

FORMATS DISPONIBLES

			
20L	205L		



IMPORTANT

Avant d'utiliser **LACTOWEST 88**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact avec la peau

Rincer à l'eau.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Inhalation

Sans objet.

Ingestion

NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE



SIMDUT

