

LACTOWEST 88

ASSAINISSEUR POUR VIANDE ROUGE ET VOLAILLE

LACTOWEST 88 est un produit à base d'acide lactique formulé spécialement pour les traitements des carcasses de viandes rouges et de volailles. Il possède un large spectre antimicrobien.

LACTOWEST 88 est un agent de conservation naturel, un anti oxygène et un acidifiant.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Non moussant
- Produit à base d'acide lactique
- Peut être utilisé par vaporisation, en immersion et par circulation



MODE D'EMPLOI

Techniques	Vaporisation, immersion et circulation.
Concentration	1,8 à 4,0% (18 ml à 40 ml par litre.)
Température	5°C à 40°C (41 à 104°F).
Temps d'opération/ temps de contact	Préférentiellement 1 heure.
Rinçage	Rinçage à l'eau potable. (Le rinçage à l'eau potable n'est pas requis si le résidu est négligeable.)

LACTOWEST 88

ASSAINISSEUR POUR VIANDE ROUGE ET VOLAILLE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair, incolore
Odeur	Caratéristique
Poids spécifique @ 20 °C	1.20
Viscosité	< 60 mPa.s @ 25°C
pH	< 2
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto inflammation	Aucune
Chlore	Non
Point d'ébullition	122°C
Point de congélation	Pas disponible
Tendance au moussage	Non moussant
Techniques de mesure de concentration	Conductivité électrique, titrage
Rinçage	Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Produits chlorés et oxydants

ENTREPOSAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

FORMATS DISPONIBLES

			
	20L	205L	



IMPORTANT

Avant d'utiliser **LACTOWEST 88**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact avec la peau

Rincer à l'eau.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Inhalation

Sans objet.

Ingestion

NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE



SIMDUT

